

4 Flex PureGel żel 100mg/g tuba 100g

Cena: 23,48 zł



Opis produktu

Redukuje ból. Leczy stawy.

4Flex PureGel to LEK w postaci bezbarwnego żelu.

Zawiera naproksen, który dobrze przenika do mazi stawowej i na długo pozostaje w tkankach stawu. Precyzyjnie działa w miejscu objętym stanem zapalnym i bólem.

- działa przeciwzapalnie
- działa przeciwbólowo

Nazwa produktu leczniczego: 4Flex PureGel, 100 mg/g, żel.

Skład ilościowy i jakościowy: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol 96%, 300 mg w 1 g żelu.

Postać farmaceutyczna: żel

Wskazania: leczenie miejscowe: bóli mięśniowo-stawowych, choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie stosować u dzieci do lat 3. Pacjenci z reakcjami alergicznymi w wywiadzie, takimi jak skurcz oskrzeli, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu

acetylosalicylowego lub innych substancji hamujących syntezę prostaglandyn.

Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Lek dostępny w aptece bez recepty

Ostrzeżenie:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

4Flex PureGel może wchodzić w interakcje z kwasem acetylosalicylowym.

Podczas leczenia żelem można stosować inne postacie farmaceutyczne naproksenu (np. czopki czy tabletki).

Dawkowanie

- Należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych.
- Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm.
- Maksymalna dawka dobową naproksenu wynosi 1000 mg.

Sposób podawania:

- Po posmarowaniu żel rozprowadzić w miejscu bólu i masować do całkowitego wchłonięcia.
- Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.
- Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak: bandaże czy plastry.

Czas trwania leczenia:

- Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni).
- Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

- Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, grupę docelową należy ograniczyć do dorosłych.