

# CICATRIDINA \*10 glob.

Cena: 30,13 zł



## Opis produktu

### Cicatridina - globulki 10 glob. po 2 g

Cicatridina globulki dopochwowe  
Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym.  
Regeneracja błony śluzowej pochwy.  
10 globulek dopochwowych.

#### Opis

Prawie każda kobieta doświadcza w swoim życiu dyskomfortu, a często przykrych dolegliwości związanych z uszkodzeniem błony śluzowej pochwy. Czynnikiem, które sprzyjają bądź powodują to uszkodzenie, mogą być: porody, zabiegi i badania ginekologiczne, zbliżenia intymne z partnerem, a także chemio- i radioterapia.

W okresie menopauzy u kobiet również występują następujące dolegliwości: suchość pochwy, świąd, pieczenie i ból przy współżyciu płciowym.

Szansą na przeciwdziałanie wszystkim tym przykrym objawom jest stosowanie globulek dopochwowych Cicatridina.

#### Wskazania Cicatridina globulki

Preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

Skład i dawkowanie Cicatridina globulki

#### Skład:

Sól sodowa kwasu hialuronowego, wąkrotka azjatycka, nagietek, aloes, drzewo herbaciane, glicerydy półsyntetyczne, BHT.

#### Dawkowanie:

po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10-20 dni przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień

Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

Podmiot odpowiedzialny

Mirelex  
ul. Modlińska 129 lok. U14, 03-186 Warszawa