

## Hemorectal - czopki doodbytnicze 10 szt.



Cena: 13,02 zł

### Opis słownikowy

Postać	Czopki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

### Opis produktu

#### ULOTKA DLA PACJENTA

Omega Pharma

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby

jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HEMORECTAL ostrożnie i zgodnie z

informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem.

### HEMORECTAL

## czopki

### Skład:

*Jeden czopek zawiera:*

*substancje czynne: bizmutu (III) galusan zasadowy 42,4 mg, bizmutu (III) tlenek 17,4 mg, bizmutu (III) oksyjodogalusan 0,6 mg, rezorcynol 17,4 mg, kwas borowy 357,0 mg, cynku tlenek 212,0 mg, balsam peruwiański 35,4 mg*

*oraz substancje pomocnicze: lak czerwieni koszenilowej (E124), tłuszcz stały.*

Dostępne opakowania:

10 czopków

Podmiot odpowiedzialny:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,

al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

### Spis treści:

1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków
3. Jak stosować HEMORECTAL
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku HEMORECTAL w postaci czopków
6. Inne informacje HEMORECTAL

## 1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

HEMORECTAL działa przeciwzapalnie i przyspiesza proces gojenia. Usuwa objawy podrażnienia w

stanach zapalnych okolicy odbytu, zmniejsza dolegliwości związane z żylakami odbytu, co umożliwia

bezbolesne i łatwiejsze oddawanie stolca.

HEMORECTAL ma właściwości ściągające i wygładzające błonę śluzową okolicy odbytu, dzięki

czemu zostaje ona wzmocniona i staje się bardziej elastyczna.

Wskazania do stosowania: żylaki odbytu (hemoroidy) i stany zapalne błony śluzowej odbytnicy.

## 2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków

Nie należy stosować leku HEMORECTAL, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników

leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując HEMORECTAL:

W przypadku krwawienia z odbytu lub nasilenia dolegliwości należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na fakt, że hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach

stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku na uszkodzoną lub otartą skórę, ponieważ

rezorcynol i kwas borowy może ulec wchłonięciu.

Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym skórne reakcje alergiczne.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w okresie

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HEMORECTAL:

Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na

tkankę nerwową.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje leku HEMORECTAL z innymi lekami nie są znane.

### **3. Jak stosować HEMORECTAL w postaci czopków**

Lek podaje się doodbytniczo.

Zazwyczaj stosuje się 1 czopek przed snem.

W cięższych przypadkach rano i wieczorem po 1 czopku.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku HEMORECTAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku HEMORECTAL niż zalecana:

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Ze względu na postać farmaceutyczną leku przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na

tkankę nerwową.

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL:

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL należy kontynuować zalecone dawkowanie

preparatu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek HEMORECTAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

Rzadko: podrażnienie, pieczenie błon śluzowych i obrzęk.

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: krwawienia z odbytu lub nasilenie dolegliwości, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

### **5. Przechowywanie leku HEMORECTAL**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku HEMORECTAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

### **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,  
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa  
Tel. (22) 489 54 51, fax (22) 489 54 52