


Hemoroidal (50 mg + 5 mg)/g żel doodbytniczy 1 tuba 30 g

Cena: 100,00 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Hemoroidal (dawniej Neo-Aesculan®)

Łagodzi objawy choroby hemoroidalnej, stosowany miejscowo żel działa znieczulająco, ściągająco i przeciwzapalnie.

Substancja czynna

1 g żelu zawiera substancje czynne: wyciąg suchy z kory kasztanowca (*Aesculus hippocastanum* L., cortex (40-90:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90% (v/v)) 50 mg; lidokainy chlorowodorek (*Lidocaini hydrochloridum*) 5 mg.

Wskazania do stosowania

Choroba hemoroidalna.

Dawkowanie i sposób podania

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasma żelu o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując żel raz na dobę. Preparat należy stosować do ustąpienia objawów. Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Podmiot odpowiedzialny

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

Opakowanie

30 g

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.
- W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych możliwe są nasilone krwawienia z okolic odbytu.

Informacje dla pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.