

JUNIOR ANGIN SYROP * 100ML

Cena: 20,03 zł



Opis produktu

Junior-angin, syrop dla dzieci o smaku czereśniowym:

- wyrób medyczny,
- dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Syrop Junior-angin jest zalecany dzieciom do złagodzenia suchego, drażniącego kaszlu, bólu gardła i stanów podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

POJEMNOŚĆ:

100ml

DZIAŁANIE:

Syrop Junior-angin zawiera 5 g wyciągu z porostu islandzkiego i 5 g wyciągu z malwy, dzięki czemu wywiera osłaniające i łagodzące działanie na błonę śluzową gardła.

- Porost islandzki stosowany jest w bólu gardła oraz suchym, drażniącym kaszlu ze względu na zawarte w nim substancje śluzowe, wykazujące działanie łagodzące podrażnienia, które niczym balsam powlekają błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

- Malwa stosowana jest w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz w związanych z nimi bólem gardła i suchym, drażniącym kaszlem. Liście i kwiaty malwy zawierają substancje śluzowe, które wykazują działanie łagodzące.

WSKAZANIA:

Junior-angin syrop dla dzieci jest wskazany do stosowania w suchym, drażniącym kaszlu, bólach gardła oraz podrażnieniach błony śluzowej gardła i jamy ustnej towarzyszącym przeziębieniom.

DAWKOWANIE:

Dzieci od 1 do 6 lat: W zależności od potrzeby 1 raz do 2 razy dziennie po 5 ml.

Dzieci i młodzież od 6 do 16 lat: 2 razy dziennie po 10 ml.

Dla podtrzymania efektów zaleca się kontynuowanie stosowania syropu Junior-angin jeszcze przez 2-3 dni po ustąpieniu objawów.

Jeśli objawy nie ustąpią po tygodniu stosowania syropu, lub nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

SKŁAD:

Wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, glukonian cynku, rorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziół przeciwkaszlowych, woda oczyszczona.

Nie zawiera alkoholu ani cukru.

Nie zawiera sztucznych barwników, laktozy ani glutenu.

WAŻNE INFORMACJE:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (substancja słodząca - maltitol). Przed zastosowaniem syropu u dzieci poniżej 1. roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. Celsjusza, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zużyć w ciągu 14 dni od pierwszego otwarcia butelki. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.