

NEOCATE JUNIOR proszek 400g sm. waniliowy

Cena: 122,62 zł

Opis produktu

NEOCATE JUNIOR proszek 400g sm. waniliowy

Opis
Neocate Junior, proszek, 400 g, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczony do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia, które wykazują alergię na białka mleka krowiego, nietolerancję innych białek pokarmowych i inne choroby, przy których jest wskazane stosowanie diety elementarnej (zawierającej wolne aminokwasy). Jest hipoalergiczny i kompletny pod względem odżywczym, na zalecenie lekarza może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Skład
Suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej ziaren palmowych i/lub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-lizyny, L-treonina, cytrynian potasu, L-tyrozyna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodofosforan disodu, węglan wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-feniloalanina, wodofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diwinian choline, L-tryptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, palmitynian L-askorbylu), tauryna, inozytol, siarczan żelaza(II), L-kanityna, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octanretinylu, jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, chlorek chromu(III), selenian(IV) sodu, fitomenadion, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Wartość odżywcza	100 g proszku	100 ml gotowego produktu*
Wartość energetyczna	1992 kJ (475 kcal)	420 kJ (100 kcal)
Tłuszcz (42 En%), w tym:	22,0 g	4,6 g
Kwasy tłuszczowe nasycone	9,4 g	2,0 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	7,6 g	1,6 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone	4,0 g	0,84 g
Węglowodany (47 En%), w tym	56,0 g	11,8 g
Cukry	5,0 g	1,1 g
Błonnik (0 En%)	0 g	0 g
Równoważnik białka (11 En%)	13,3 g	2,8 g
Sól	0,71 g	0,15 g
Witaminy:		
Witamina A	214 µg RE/ER	45,2 µg RE/ER
Witamina D	6,2 µg	1,3 µg
Witamina E	6,7 mg α-TE/ET	1,4 mg α-TE/ET
Witamina K	19,0 µg	4,0 µg
Tiamina	0,48 mg	0,10 mg
Ryboflawina	0,95 mg	0,20 mg
Niacyna	(9,0 mg NE/EN) 5,3 mg	(1,9 mg NE/EN) 1,1 mg

Kwas pantotenowy	1,9 mg	0,40 mg
Witamina B ₆	0,48 mg	0,10 mg
Kwas foliowy	71,3 µg	15,0 µg
Witamina B ₁₂	1,2 µg	0,25 µg
Biotyna	14,3 µg	3,0 µg
Witamina C	47,5 mg	10,0 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:		
Sód	285 mg	60,1 mg
Potas	546 mg	115 mg
Chlorki	437 mg	92,2 mg
Wapń	428 mg	90,3 mg
Fosfor	309 mg	65,2 mg
Magnez	66,5 mg	14,0 mg
Żelazo	5,7 mg	1,2 mg
Cynk	5,2 mg	1,1 mg
Miedź	0,48 mg	0,10 mg
Mangan	0,29 mg	0,06 mg
Molibden	21,4 µg	4,5 µg
Selen	15,2 µg	3,2 µg
Chrom	7,6 µg	1,6 µg
Jod	71,3 µg	15,0 µg
Inne:		
Cholina	95,0 mg	20,0 mg
Inozytol	26,1 mg	5,5 mg
L-karnityna	15,80 mg	3,3 mg
Tauryna	31,45 mg	6,6 mg
Osmolalność		580 mOsmol/kg H ₂ O

21,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się, dodając dwie płaskie miarki proszku (16 g) do 65 ml wody, co daje końcową objętość 75 ml. 1 płaska miarka = 8 g proszku.

Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie musi być określona wyłącznie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Masa netto

400 g

Właściwości

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Neocate Junior, to hipoalergiczny, kompletny preparat odżywczy dla dzieci powyżej 1. roku życia. Zawiera wolne aminokwasy w optymalnych proporcjach, dzięki czemu może być stosowany u dzieci z alergiami na białka mleka i inne białka pokarmowe, a także przy schorzeniach, w których zalecana jest dieta elementarna. Zawiera witaminy i składniki mineralne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu małego dziecka.

Przeznaczenie

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Neocate Junior jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u dzieci po 1 życia, w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Sposób użycia

Zawsze przygotowywuj preparat Neocate Junior zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie musi być określona wyłącznie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta!

Przed przygotowaniem pokarmu zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji przygotowania i

przechowywania pokarmu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Umyj starannie ręce i miejsce przygotowania posiłku. Smoczek i butelkę wysterylizuj w sterylizatorze parowym, lub wygotuj w świeżej, pitnej wodzie przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez co najmniej 5 minut i pozostaw do wystygnięcia. Woda powinna być ciepła po sprawdzeniu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni.

Wlej wymaganą ilość wody do wysterylizowanej butelki lub kubka.

Napełnij miarkę załączoną do opakowania proszkiem Neocate Junior, nadmiar proszku usuń czystym, suchym nożem.

Nie ubijaj proszku w miarce. Używaj tylko miarki załączonej do opakowania.

Dodaj zaleconą ilość miarek proszku Neocate Junior do wody. Wymieszaj, aż proszek się rozpuści.

Przed podaniem sprawdź temperaturę pokarmu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni.

Niewykorzystaną porcję pokarmu, która pozostała w butelce po karmieniu należy wyrzucić po godzinie od przygotowania.

Nie wolno podgrzewać posiłku podczas karmienia.

Produkt, który pozostał w butelce, należy wykorzystać najpóźniej godzinę po przygotowaniu lub wyrzucić.

Nie wolno ponownie odgrzewać pozostałej porcji.

Jeżeli przygotowana porcja nie jest przeznaczona do spożycia w ciągu 1 godziny od przygotowania, należy ją szybko i bezpośrednio po przygotowaniu schłodzić i przechowywać w lodówce (w temperaturze maksymalnej 5°C) nie dłużej, niż 24 godziny.

Przechowywanie w temperaturze niższej lub równej 5°C zapobiega lub spowalnia proces namnażania szkodliwych bakterii.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować u niemowląt poniżej 1 roku życia.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego należy zawsze stosować po konsultacji i pod nadzorem lekarza.

Całkowite lub częściowe zastąpienie mleka matki w karmieniu niemowląt innymi preparatami odżywczymi powinno być poprzedzone konsultacją lekarską.

Produkt Neocate Junior należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przechowywać puszek z proszkiem w lodówce.

Zużyć proszek Neocate Junior w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia puszek.

Zamknięte fabrycznie puszki należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Dopuszczalny zakres temperatury przechowywania wynosi od 4°C do 25°C.

Nie zaleca się schładzania i przechowywania dużej porcji posiłku, ponieważ duża objętość sprawia, że chłodzenie może przebiegać zbyt wolno i prowadzić do namnażania szkodliwych bakterii.

Nie należy zamrażać porcji posiłku. Zamrażanie może sprawiać, że produkt płynny przestanie nadawać się do użytku (może wystąpić brązowe zabarwienie).

Jeżeli posiłek przed karmieniem jest podgrzewany, proces ten nie powinien trwać dłużej niż 15 minut. Posiłku nie wolno przegrzewać, ponieważ nadmierna temperatura może wpływać na stabilność składników odżywczych.

Raz podgrzanej porcji pokarmu nie wolno wkładać do lodówki.

Część mieszanki niewykorzystana w ciągu pierwszej godziny karmienia powinna zostać wyrzucona.

Mieszanki nie należy doprowadzać do wrzenia lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej albo tradycyjnym piekarniku. Nadmierne podgrzanie może spowodować utratę składników odżywczych i zmienić smak.

Istotne jest, aby przestrzegać wytycznych na etykiecie dotyczących stosowania i przechowywania produktu. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Wszystkie mieszanki Neocate są starannie zbilansowane tak, aby zapewnić optymalną podaż składników odżywczych dla niemowląt i dzieci z alergią na białko mleka krowiego. Nie należy dodawać innych produktów do Neocate, chyba że lekarz lub dietetyk zaleci inaczej. Należy z lekarzem lub dietetykiem omówić kwestię w przypadku konieczności odstawienia od piersi.

Nie zaleca się dodawania dodatków smakowych w celu poprawienia smaku produktu. Produkty Neocate zostały starannie opracowane pod kątem zapewnienia hipoalergicznego. Poprzez dodatki smakowe może dojść do wprowadzenia substancji, które mogą prowadzić do ponownego wystąpienia objawów alergii u niemowlęcia lub dziecka.

Producent
SHS INTERNATIONAL
White Horse Business Park, Newmarket Avenue
Trowbridge, Wiltshire, Wielka Brytania