

OLIMP Immuven x 6sasz. s. kawowy

Cena: 70,16 zł



Opis produktu

Olimp Immuven o smaku kawowym - proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszetce 6 sasz.

Opis produktu

IMMUVEN® to żywność kompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do stanu lub ryzyka niedożywienia oraz okresów okołoperacyjnych, przed zabiegami i po urazach, która w przypadku stosowania zgodnie z instrukcjami producenta może stanowić wyłączone źródło pożywienia dla osób, dla których jest przeznaczona. Zawiera kompozycję niezbędnych składników pokarmowych – białek serwatkowych, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro- i makroelementów, a także kwasy omega-3, L-argininę i beta-glukany z drożdży (*Saccharomyces cerevisiae*). Może stanowić zarówno całkowite zastąpienie diety jak i jej uzupełnienie.

Składniki

Informacja żywieniowa 1 porcja/ 1 saszetka rozpuszczona w 150 ml wody (200 ml płynu)

Wartość energetyczna 1265 kJ/ 300 kcal

Tłuszcz 8,0 g

w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,5 g

w tym kwasy tłuszczowe omega-3 \geq 435 mg

w tym:

kwaseйкоzапентаenowy (EPA) \geq 255 mg

kwaseйкоzаheksаenowy (DHA) \geq 180 mg

Węglowodany 39 g

w tym cukry 4,3 g

Błonnik 0 g

Białko 18 g

Sól 0,15 g

Witamina A (µg-RE) 160 µg
Witamina D 10 µg
Witamina K 15 µg
Witamina C 160 mg
Tiamina 0,5 mg
Ryboflawina 0,28 mg
Witamina B6 0,28 mg
Niacyna (mg NE) 3,2 mg
Kwas foliowy 40 µg
Witamina B12 0,5 µg
Kwas pantotenowy 1,2 mg
Biotyna 10 µg
Witamina E (mg α-TE) 4 mg
Sód 170 mg
Chlorki 160 mg
Potas 400 mg
Wapń 160 mg
Fosfor 140 mg
Magnez 75 mg
Żelazo 2,8 mg
Cynk 5 mg
Miedź 203 µg
Jod 30 µg
Selen 30 µg
Mangan 0,4 mg
Chrom 8 µg
Molibden 10,5 µg
Fluorki 0 mg
Beta-glukany z drożdży (*Saccharomyces cerevisiae*) 100 mg
L-arginina 4500 mg
Osmolarność 325 mOsm/l*

* RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: maltodekstryny kukurydziane, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), olej roślinny (rzepakowy), L-arginina, olej rybi (źródło kwasów omega-3), aromaty, sole potasowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy – witamina C, chlorek sodu, beta-1,3/1,6-glukan (z *Saccharomyces cerevisiae*), substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; diglicynian cynku, difosforan żelaza(III) (pirofosforan żelaza(III)), selenian(IV) sodu, octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, cholekalcyferol – witamina D, glukonian manganu, nikotynamid – niacyna, octan retinylu – witamina A, glukonian miedzi(II), D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, monoazotan tiaminy – tiamina, cyjanokobalamina – witamina B12, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6, filochinon (fitomenadion) – witamina K, ryboflawina, barwnik – E 150c, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – folian, chlorek chromu(III) i jego heksahydrat, jodek potasu, molibdenian(VI) sodu, D-biotyna – biotyna.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku osłabionego układu immunologicznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia w okresach okołoperacyjnych, przed zabiegami i po urazach, zwłaszcza u pacjentów chirurgicznych oraz w przypadku trudno gojących się ran (np. odleżyny, stopa cukrzycowa, rany pooperacyjne), a także w stanach po udarach w fazie intensywnej rehabilitacji.

Dawkowanie

Instrukcja stosowania: 1 saszetka (78 g) produktu 1-3 razy na dobę przez 5 dni przed operacją/ zabiegiem i po operacji/ zabiegu jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli jest stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Instrukcja przygotowania: w celu sporządzenia 250 ml produktu gotowego do spożycia, należy do naczynia zawierającego 200 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej wsypywać powoli zawartość 1 saszetki, ciągle mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Ważna informacja: preparat przeznaczony do stosowania pod nadzorem lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku występowania innych chorób (np. nadciśnienia) lub przyjmowania leków należy poinformować lekarza. W trakcie stosowania nie spożywać alkoholu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie spożywać innych preparatów zawierających cynk (dotyczy spożywania trzech saszetek dziennie lub więcej). Poinformować lekarza w przypadku predyspozycji do tworzenia kamieni nerkowych lub kamicy nerkowej.

Środki ostrożności:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.

Producent

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica