

VIGANTOL krople 20.000 im./1ml-10ml"



Cena: 20,12 zł

Opis produktu

VIGANTOL®

500 mikrogramów/ml, krople doustne, roztwór. Witamina D3 w kroplach dostępna jako lek bez recepty. Vigantol® to efekt 90 lat doświadczenia z witaminą D.

Vigantol 500 mcg/ml (20 000 IU/ml) krople doustne, roztwór 1 butelka 10 ml

Skład

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3) Pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Witamina D3 jest ważna w procesie tworzenia kości. W niedoborach witaminy D3 występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Substancja czynna

1 kropla zawiera 12,5 mikrogramów cholekalcyferolu, co odpowiada 500 j.m. witaminy D3

Zastosowanie

Vigantol ® stosuje się w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych a także w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków. Vigantol ® pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D3 i zmniejsza ryzyko ich występowania a tym samym jest stosowany w celu zapobiegania schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D3 u dzieci i dorosłych. Jest także zalecany w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

Zalety

może być stosowany od pierwszych dni życia, w tym u wcześniaków*
witamina D3 w kroplach będąca lekiem dostępnym bez recepty

* jedynie pod nadzorem lekarza

Stosowanie i dawkowanie

Wcześnieńki

2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40 tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.

Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca)

1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3). U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dzieci, młodzież, dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3).

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych

2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Sposób podawania

Zapobieganie krzywicy u wcześniaków, noworodków i niemowląt:

Vigantol® podaje się dzieciom od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku życia.

Krople podawać z łyżką mleka lub pokarmu. Jeśli krople dodaje się do butelki lub do pokarmu, należy upewnić się, czy dziecko zjadło cały posiłek, w przeciwnym razie dawka nie będzie przyjęta w całości.

Przy wyznaczaniu dawki należy uwzględnić zawartość witaminy D3 w pokarmie, jeśli stosuje się równocześnie pokarm z dodatkiem witaminy D3 i Vigantol®.

Noworodki karmione piersią, których matki przyjmowały witaminę D3 w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D3 począwszy od trzeciego tygodnia życia.

Noworodki karmione piersią, których matki nie otrzymywały witaminy D3 w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D3 począwszy od pierwszych dni życia.

Noworodki karmione mlekiem modyfikowanym, spożywające w ciągu doby objętość mleka, która dostarcza należną ilość 400 IU na dobę, nie wymagają suplementacji witaminy D3.

Starsze dzieci i dorośli:

Vigantol® należy podawać z łyżką płynu.